

Российские вакцины против коронавируса

Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»)	«ЭпиВакКорона»	Вакцина НИИ им. М.П. Чумакова
Вводится двукратно, с интервалом в 3 недели	Вводится двукратно, с интервалом в 2-3 недели	Вводится двукратно, с интервалом в 2 недели

Возможные побочные явления:

- ♦ Кратковременное повышение температуры
- ♦ Головная боль
- ♦ Слабость
- ♦ Боль в мышцах и суставах
- ♦ Заложенность носа
- ♦ Першение в горле
- ♦ Сыпь
- ♦ Аллергические реакции



Защити себя и близких

ВАКЦИНАЦИЯ — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сделай прививку

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Адрес: г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3
Телефон: (8362) 45-05-59
Эл. почта: profwork.miac@minzdrav12.ru

Социальные сети:
«ВКонтакте» Группа «ЗОЖ Марий Эл»
<https://vk.com/club144879070>;
«Instagram» (@zozh_12_mari_el);
«Facebook» Группа «ЗОЖ Марий Эл»
<https://www.facebook.com/groups/618642335683651/permalink/651356579078893/>.



Лучшая защита — это вакцинация

COVID-19





Крепкое здоровье—наша главная цель! Вакцинация от короновиральной инфекции позволит сохранить ваше здоровье и сберечь жизнь.

К вакцинации допускаются здоровые люди старше 18 лет, не имеющие аллергии на компоненты вакцины или серьезных аллергических реакций в прошлом.

Вакцинация проводится вне периода острого или обострения хронического заболевания (ее проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии).

Введение вакцины противопоказано при беременности или грудном вскармливании.

Проведение вакцинации против COVID-19

Перед вакцинацией врач проводит осмотр-консультацию, измеряет температуру и артериальное давление, собирает эпидемиологический анамнез. На основании осмотра он определяет, есть ли противопоказания. Врач расскажет вам о возможных реакциях на вакцину и поможет заполнить информированное добровольное согласие.



После вакцинации в течение 30 минут просим вас оставаться в медицинской организации для наблюдения

После вакцинации

В первые-вторые сутки может появиться непродолжительная слабость, озноб, повышение температуры, боли в суставах и мышцах, головная боль, чувство сердцебиения. Также возможна кратковременная болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность. Реже отмечается тошнота, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов. Возможны аллергические реакции.

В течение суток после вакцинации не рекомендуется мочить место инъекции, в течение трех дней—посещать баню или сауну, принимать алкоголь. Также необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок. Это важно для полноценной работы иммунитета.

ПЕРВЫМ ВАКЦИНУ СТАВЯТ:



В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из группы риска:

- ♦ Лица старше 60 лет;
- ♦ Люди с хроническими заболеваниями;
- ♦ Работники социальной сферы и другие, работающие с большим количеством людей.